


あさのは

麻の葉(あさのは)文様とは、古来より日本にある、成長・健康を願う模様です

医療法人社団哺育会 浅草病院
院外広報誌



Vol.9

2022.01



新年ごあいさつ

病院長年頭あいさつ

眼 科

意外と知らない眼のトラブル

新年明けまして

おめでとうございます

浅草病院の2022年が始動しました。

昨年はコロナ禍が全世界を覆い尽くし、社会にとって大変な一年となりました。当院では地域の皆さまのご協力もあって、変化にそった医療体制を構築し、安心安全な医療提供に努めることができました



た。また、たくさんの方々から応援メッセージ、支援物資のご提供を頂きましたこと、改めて心から御礼申し上げます。


今年の干支は「壬寅（みずのえとら）」です。「壬」は「妊に通じ、陽気を下に妊（はら）む」という意味で「壬」は十千の9番目となり、次の生命を育む準備の時期を表しています。一方、「寅」は「蟻（ミズ）に通じ、春の草木が生ずる」という意味があります。すなわち「壬寅」は厳しい冬を越えて、芽吹き始め、豊穡

に向かって新しい成長の礎となる年となることを示しています。

この干支のごとく、今年は職員一人一人が活躍できるより更なる向上と成長をめざし職員の幸せを通じ、皆さま方のいっそうのご健康と幸福向上のために一丸となって努力を続けていこうと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

浅草病院

病院長 日野博文




歪んでいませんか？




ご自身でチェック
してみてください


- ①約 30cm離れる
- ②片目を閉じて表の
中央の黒い点を見
つめてください




下図のように見た場合はすぐに受診してください



ゆがんで見える



薄暗く見える




欠けて見える

歪んで見える、薄暗く見える、欠けて見えるなど見え方に異常を感じたら受診しましょう。疾患としては黄斑前膜、黄斑浮腫、中心性漿液性脈絡網膜症など眼底疾患の可能性あります。

当院では各疾患により、レーザー治療、硝子体注射、テノン嚢下注射、硝子体手術などを行っております。

また、次頁の疾患についても当院で取り扱いを行っております。



の病気について


白内障

目の中にあるレンズ「水晶体」が濁ってしまって光がうまく通らなかったり、乱反射して網膜にうまく像が結べなくなります。結果、モノがかすんで見える、二重に見える、まぶしいなどの症状が起こります。

年齢を重ねることによって出てくる白内障がほとんどですが、それ以外にも、アトピーやステロイドの長期使用、目をぶつけたなど様々な原因で白内障は起こります。進んでしまった白内障は手術でしか治療できません。

当院では片目ずつ1泊2日で局所麻酔での手術を行っております。

白内障の眼球



水晶体が濁り、光が通りにくくなります。


加齢黄斑変性

加齢黄斑変性は網膜の中心にある黄斑に変性が起こり、ものが見えにくくなる病気です。物が歪んで見える、見たい部分がぼけて見える、見たい部分が暗く見えるなどの症状が起こります。日本の視覚障害者の原因の第4位で高齢者増加に伴い増えてきております。

加齢黄斑変性には萎縮型と滲出型の2種類があります。日本人に多いのは滲出型のタイプで

VEGF 阻害薬の注射療法や光線力学的療法により治療します。


当院では VEGF 阻害薬の硝子体注射を日帰りで行っております。



緑内障

目詰まりによって
防水が排水されない

緑内障の眼球



眼圧（眼球内部の圧力）の上昇によって視神経がダメージを受ける病気です。視野が欠けたり、ものが見えづらいなどの症状が起こります。

緑内障の治療は眼圧を下げることです。障害されてしまった視神経は、残念ながら回復することはありません。また、どんなに手を尽くしても進行を止められない緑内障もあります。治療の目的は進行を止める、または遅らせることであり、回復させるものではありません。

治療方法としては、薬物療法・レーザー治療・手術があります。

当院では、視野検査は予約制で行っており、薬物治療のみ行なっております。

斜 視

物を見ようとする時に、片目は正面を向いていても、もう片目が違う方向を向いてしまっている状態、左右の視線が合わない状態です。

ほとんどは目を動かす筋肉や神経の異常によるものや遠視によるものがあり、弱視になることもあります。

通 常



ないしやし
内斜視



がいしやし
外斜視



弱 視


弱視は、メガネやコンタクトをしても視力が出ない状態です。屈折異常、斜視などにより視覚刺激を受け取ることができなかったた

めに視力の発達が止まったり遅れたりすることで起こります。気づかれないことが多く、3歳児検診、就学時検診で見つかることもあります。視覚感受性期にメガネ装用、アイパッチ、手術などの適正な治療を受けることで視力が改善していきます。

急に見え方に異常を感じたら

網膜静脈分枝閉塞症のはなし

網膜静脈閉塞症とは、文字通り、網膜の静脈が閉塞して血管が詰まって血液が流れなくなる病気です。目詰まりしたホース（静脈）



に水（血液）を流すと、やがてホースの内圧が高まり穴が空いて水が飛び出し周り（網膜）を水浸しにしてしまうのと同じことが、眼底で起こっています。糖尿病網膜症と並び、眼底出血を起こす代表的な原因に挙げられます。

50 歳以上の年配の方に起きやすい病気ですが、高血圧に非常に深い関係があります。これは、高血圧によって、網膜の血管が硬くなること（動脈硬化）が影響しています。

高血圧のほかに、高脂血症、血管自体の炎症、糖尿病などがある場合にも、発症しやすくなります。

初期症状

- 静脈の閉塞した場所の上流部分で血液や水分が漏れ、眼底出血や網膜浮腫が起こります
- 眼底出血や網膜浮腫が黄斑におよぶと（黄斑浮腫）、視力低下を起こしたり、ものがゆがんで見えたりします
- 静脈の閉塞した場所によって、自覚症状は無症状から重い視力障害までさまざまです



経過

- 一般的に、視力の経過はさまざまです。ただし、黄斑浮腫が長期化すると、視力は回復しにくいです
- 時間が経つと、閉塞した静脈のある網膜の血液循環が悪くなることがあります（虚血）
- 虚血になった網膜には、毛細血管の代替としてもろい血管（新生血管）が生じます。この新生血管が硝子体へ伸びて破れることで硝子体出血や網膜剥離を引き起こすことがあります

治療

視力が低下していない場合は、経過観察します。視力が低下した場合は、黄斑浮腫を改善する治療を実施します。主に次の 4 種類から、目の状態に適したものが選ばれます。

- ① VEGF 阻害剤
- ② レーザー光凝固
 - ・ 汎網膜光凝固 ・ 格子状光凝固 ・ 局所光凝固
- ③ 硝子体手術
- ④ ステロイド薬

新生血管の予防処置をする場合は眼の状態によって「レーザー光凝固術」で網膜を焼き固め、新生血管が生じないようにします。

大切なのは早期発見と治療

網膜静脈閉塞症は、眼球内に多くの影響を及ぼします。閉塞の部位や程度によっては、本人が全く気付かないこともありますし、高度の視力障害に至ることもあります。発症後は、定期的な眼科検査を欠かさず受けるようにしましょう。

またこの病気は、発症の時期をずらして両眼に起きることもあるので、片眼の視力がさほど回復しなかった場合でも、もう片方の眼を守るために、内科で血圧、血糖値、コレステロール値の管理や、眼科に定期的な受診することを心掛けてください。





送迎バス運行中!

無料シャトルバス(送迎)を運行しております。

浅草病院⇄浅草駅、浅草病院⇄南千住駅
を約20分間隔で運行していますので是非
ご利用ください。

詳細につきましては、当院ホームページ
または受付にご用意しておりますので、
お声掛けください。

※浅草病院到着口は正面玄関前になります

※浅草病院 **出発口は地下1階** 駐車場になります



東武〔浅草〕駅 往復便



<月曜日～金曜日>

浅草病院 発	時	浅草駅北口 発
30 50	7	40
10 40	8	00 20 50
00 20	9	10 30
10 30 50	10	20 40
20 40	11	00 30 50
00 30 50	12	10 40
10	13	00 20
30 50	14	40
10 40	15	00 20 50
00 50	16	10
10 30	17	00 20 40
00 20	18	10 30

<土曜日>

浅草病院 発	時	浅草駅北口 発
50	7	40
10 40	8	00 20 50
00 20 40	9	10 30 50
10 30 50	10	20 40
20 40	11	00 30 50
00 30 50	12	10 40
10	13	20

〔南千住〕駅 往復便




<月曜日～金曜日>

浅草病院 発	時	南千住駅東口 発
30 50	7	40
10 40	8	00 20 50
00 20	9	10 30
10 30 50	10	20 40
20 40	11	00 30 50
00 30 50	12	10 40
10	13	00 20
30 50	14	40
10 40	15	00 20 50
00 50	16	10
10 30	17	00 20 40
00 20	18	10 30

<土曜日>

浅草病院 発	時	南千住駅東口 発
50	7	40
10 40	8	00 20 50
00 20 40	9	10 30 50
10 30 50	10	20 40
20 40	11	00 30 50
00 30 50	12	10 40
10	13	20

アクセス



行き（浅草駅から）



都営バス
「東武浅草駅前」発
「南千住駅西口」行
「東浅草」下車



都営バス
「東武浅草駅前」発
「南千住車庫前」行
「東浅草」下車



北めぐりん
「浅草駅」発
（浅草まわり）
「今戸2丁目」下車

行き（南千住駅から）



都営バス
「南千住駅西口」発
「東神田」行、
「東京駅八重洲口」行
「東浅草」下車



都営バス
「南千住車庫前」発
「浅草雷門」行
「浅草病院前」下車

帰り（浅草駅へ）



都営バス
「浅草病院前」発
「浅草雷門」行
「東武浅草駅前」
下車



ぐるーりめぐりん
「浅草病院前」発
「浅草駅」下車



都営バス
「東浅草」発
「東神田」行、
「東京駅八重洲口」行
「東武浅草駅前」下車

帰り（南千住駅へ）



都営バス
「東浅草」発
「南千住駅西口」行、
「南千住車庫前」行
終点下車



都営バス
「今戸2丁目」発
「南千住車庫前」行
終点下車

公共交通機関をご利用の場合

■浅草駅

（東京メトロ銀座線、都営浅草線、東武スカイツリーライン）

●都営バス「東武浅草駅前」から乗車

- 「南千住車庫前行き」または「南千住駅西口行き」
「東浅草」下車。徒歩8分
- 「南千住車庫前行き」。「今戸2丁目」下車。徒歩4分

●台東区循環バス 北めぐりん「浅草駅」から乗車

- 「今戸2丁目」下車。徒歩4分

●浅草駅より徒歩約20分

●浅草駅からタクシー8分

■南千住駅

（JR常磐線、東京メトロ日比谷線、つくばエクスプレス）

●都営バス「南千住車庫前」から乗車

- 「浅草雷門行き」。「浅草病院前」下車

●都営バス「南千住車庫前」または「南千住駅西口」から乗車

- 「東神田行き」または「東京八重洲口行き」。「東浅草」下車。
徒歩8分

●南千住駅からタクシー8分

お車をご利用の場合

当院には駐車場はございません。公共交通機関等をご利用ください。

病院周辺の道路は大変道幅の狭い地域です。無断駐車でご迷惑のかからないようご協力をお願いいたします。

やむを得ずお車でお越しの場合は、近隣の有料駐車場をご利用ください。

受付・診療時間

受付

診療

午前

初診 8:00 ～ 11:30 / 再診 8:00 ～ 12:20

9:00 ～

午後

12:30 ～ 17:00

14:00 ～

夕診

17:00 ～ 18:00

17:30 ～



あさのは9号 2022年1月発行
発行：医療法人社団哺育会浅草病院
編集：IT・広報委員会
〒111-0024 東京都台東区今戸2-26-15
TEL.03-3876-1711
<https://www.asakusa-hp.jp/>

浅草病院
You Tube



浅草病院
ホームページ

